



VIOLENCIA DE GÉNERO

Coordinadora: Núñez Jaldón, Ángela M.

VIOLENCIA DE GÉNERO	1
ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.....	2

Capítulo perteneciente al MANUAL CLÍNICO DE URGENCIAS del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

ISBN: 978-84-09-24021-0

Copyright © 2020 Hospital Universitario Virgen del Rocío

Reservado todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación pública de esta obra, sólo puede ser realizada con autorización de su o sus autores.

ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO


*Murube Fernández Cotta, María Luisa
Núñez Jaldón, Ángela M.
Camero Macías, José Manuel*

Como protagonistas directos en la identificación de víctimas de violencia de género los profesionales sanitarios de la Unidad de Gestión de Urgencias debemos conocer las características de estos pacientes y tener clara la actuación con objeto de crear la alerta correspondiente y ser parte activa de apoyo a las víctimas.

Debemos tener una actitud alerta y realizar una búsqueda activa de conductas, síntomas y signos de sospecha. Resulta difícil identificar estas situaciones si no lo verbaliza ni existen lesiones físicas.

DEFINICIÓN	SIGNOS Y SÍNTOMAS	ACTUACIÓN
<p>Indicador de Sospecha de Malos Tratos (ISMT):</p> <p>Signos + Síntomas + Negación</p>	<p>Signos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes de violencia, malos tratos en la infancia. • Abuso de tóxicos. • Hiperfrecuentación alternado con largas ausencias. • Incumplimiento. • Acudir con la pareja cuando antes iba sola. • Situación de vulnerabilidad. <p>Actitud temerosa, Incongruencia entre lesión y causa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intervenir según motivo de consulta. • Anotar en la historia ISMT. • Detectar Situaciones Objetivas de Riesgo. <p>Comunicar el caso al personal de trabajo social del centro.</p>
<p>Confirmación de Maltrato (CMT):</p> <p>Signos + Síntomas + Confirmación</p>	<p>Síntomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de control de fecundidad. • ITS no justificables. • Lesiones genitales. • Demanda repetida de métodos anticonceptivos de emergencia. • Historia de abortos repetidos, bajo peso al nacer o problemas de recuperación puerperal. <p>Síntomas físicos y psicológicos inespecíficos frecuentes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valoración biopsicosocial de las lesiones. • Valoración de la situación de maltrato y de la fase de proceso de cambio en el que se encuentra la mujer. • Anotar en la historia CMT. • Detectar Situaciones de Peligro Extremo. <p>Comunicar el caso a Trabajo Social.</p>

ACTUACIONES DE LOS PROFESIONALES ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES



Más Información a través de la intranet Corporativa

<http://intranethuvr.dmsas.sda.sas.junta-andalucia.es/areasdedireccion/DireccionGerencia/comisionvg/SitePages/Inicio.aspx>



1. Características de las lesiones:

- Retraso en la demanda de asistencia de las lesiones físicas.
- Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación de la causa.
- Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza, brazos o muslos.
- Lesiones por defensa (en antebrazos y región dorsal).
- Lesiones en diferentes estadios de curación que indican violencia de largo tiempo de evolución.
- Lesiones en genitales.
- Lesiones durante el embarazo en genitales, abdomen y mamas.
- Lesión típica: rotura de tímpano.

2. Actitud de la mujer:

- Temerosa, evasiva, incómoda, nerviosa, se altera por ejemplo al abrirse la puerta.
- Rasgos depresivos: triste, desmotivada, desilusionada, sin esperanza.
- Autoestima baja.
- Sentimientos de culpa.
- Estado de ansiedad o angustia, irritabilidad.
- Sentimientos de vergüenza: retraimiento, comunicación difícil, evitar mirar a la cara.
- Vestimenta que puede indicar la intención de ocultar lesiones.
- Falta de cuidado personal.
- Justifica sus lesiones o quita importancia a las mismas.

Si está presente su pareja:

- Temerosa en las respuestas.
- Busca constantemente su aprobación.

3. Actitud de la pareja:

- Solicita estar presente en toda la visita.
- Muy controlador, siempre contesta él o, por el contrario, despreocupado, despectivo o intentando banalizar los hechos.
- Excesivamente preocupado o solícito con ella.
- A veces colérico u hostil con ella o con el profesional.

***Cuando se emite parte de Lesiones, se entregará una copia a la mujer,
o persona en quien ella confíe.
El parte de lesiones será escaneado para su envío al juzgado y a la UTS del centro.***